



Algorithme de dépistage des femmes de 30 à 65 ans



* cellules malpighiennes atypiques de signification indéterminée

Algorithme de dépistage des femmes de 25 à 29 ans



Bibliographie

- Cancer du col de l'utérus - Santé Publique France
- Le dépistage du cancer du col en pratique- INCa -décembre 2020
- Évaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus et de la place du double immuno-marquage p16/Ki67-HAS-juillet 2019



**PRÉLÈVEMENTS
CERVICO-UTÉRINS ET
PCR HPV DANS NOS
LABORATOIRES***

Dépistage du cancer du col de l'utérus

* Loi RIST Mai 2023 : autorise les pharmaciens biologistes à réaliser les prélèvements cervico-utérins



L'HPV (Human PapillomaVirus)

- **L'HPV se transmet lors des rapports sexuels, avec ou sans pénétration.**
Dans la plupart des cas, l'infection a lieu au début de la vie sexuelle. Le préservatif protège imparfaitement contre l'infection.
- Dans 90 % des cas **l'infection est transitoire** et disparaît spontanément.
- Le cancer du col de l'utérus (CCU) est principalement dû à **une infection persistante**, d'une durée de 10 à 15 ans.
- Il existe **14 génotypes d'HPV**, dits à Haut Risque (HR), impliqués dans le CCU.
- **Les HPV de type 16 et 18**, sont les plus fréquemment en cause, présents dans plus de 70 % des cas de CCU.

Un dépistage régulier permettrait de réduire l'incidence de plus de 90% !

QUELQUES CHIFFRES

80%
des femmes infectées par l'HPV au moins une fois dans leur vie

3 100
nouveaux cas de CCU/an

1100
décès du CCU/an

63%
de survie à 5 ans après diagnostic de CCU

<35%
des adolescentes vaccinées

<60%
des patientes dépistées



QUI DÉPISTER ?

Toutes les femmes de **25 à 65 ans**



Le dépistage inclut :

- les femmes vaccinées contre les HPV
- les femmes enceintes
- les femmes ménopausées

La **stratégie diagnostique** est différente en fonction de l'âge (HAS 2019) :

- Les femmes de **25 à 29 ans** : dépistage primaire par **cytologie**
- Les femmes de **30 à 65 ans** : dépistage primaire par **test HPV-HR**

Les femmes n'ayant pas réalisé de tests de dépistage dans les intervalles recommandés recevront une invitation envoyée par le Comité Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC, dépistage organisé).



LES TESTS

	Examen Cytologique	Test HPV-HR
Prélèvement	Cervico-utérin	
Préleveur	Gynécologue, sage-femme, généraliste biologiste médical (pharmacien ou médecin)	
Milieu de prélèvement	Liquide (permet un test réflexe*)	
Analyse	Morphologie des cellules du col de l'utérus	Détection par PCR des HPV-HR
Patiente	De 25 à 29 ans	De 30 à 65 ans
Fréquence initiale	2 examens cytologiques à 1 an d'intervalle	- 3 ans après un examen cytologique normal - Dès 30 ans, en l'absence d'examen cytologique antérieur
Fréquence	Tous les 3 ans si les 2 premiers examens cytologiques sont négatifs	Tous les 5 ans si le dernier test HPV-HR est négatif
Auto-prélèvement vaginal	Impossible	Possible**

*test réflexe : test ajouté sur le même prélèvement en cas de positivité, il évite un 2ème prélèvement à la patiente.

** L'auto-prélèvement vaginal (APV) est une alternative au prélèvement cervico-utérin (PCU), pour les femmes à partir de 30 ans, qui refusent la pose du spéculum. Attention, dans ce cas, seul le test HPV-HR est réalisable, en cas de positivité l'examen cytologique complémentaire devra être réalisé sur un nouveau PCU.

À noter :

Pas d'intérêt du dépistage

chez le conjoint d'une partenaire positive

Pas de test HPV ni APV

chez la femme < 30 ans



VACCINATION

Filles et Garçons :

Vaccination débutée entre 11 et 14 ans : 2 doses M0 M6

Vaccination débutée entre 15 et 19 ans : 3 doses M0 M2 M6

Vaccination chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) jusqu'à 26 ans : 3 doses M0 M2 M6.

PRÉLÈVEMENTS AU LABORATOIRE

Les patientes peuvent prendre rendez-vous dans un de nos laboratoires Cerballiance via **Doctolib** ou en contactant directement le laboratoire.



Cerballiance